

Hudlægen informerer om

# Dapson



Dansk dermatologisk Selskab 2009

I pjecen informeres om behandling med Dapson.  
Hvis der er spørgsmål, som ikke er besvaret, bør de stilles til hudlægen.

#### **Hvordan virker Dapson?**

Dapson dæmper betændelsesprocesser og kan anvendes til behandling af visse sjældne hudsygdomme.

#### **Hvordan tages Dapson?**

Dapson gives som tabletter og tages 1 gang dagligt med lidt vand.

#### **Dapson og anden medicin**

Det er vigtigt at du oplyser hudlægen om din øvrige medicin.

Følgende medicin kan påvirke Dapson behandlingen:

- Probenecid
- Trimetoprim
- Pyrimethamin
- Rifampicin
- Methotrexat

#### **Bivirkninger**

Dapson binder sig til de røde blodlegemer og kan derved hæmme iltningen. Dette kan medføre træthed, hovedpine, svimmelhed, kvalme og vejrtrækningsbesvær. Det er derfor vigtigt med jævnlig blodprøvekontrol efter aftale med din hudlæge.


I mere sjældne tilfælde kan der forekomme leverpåvirkning, nyrefunktionspåvirkning, knoglemarvspåvirkning, synsforstyrrelser, ændret følesans, nervøsitet eller udslæt.

Hvis du er allergisk overfor sulfonamider kan du ligeledes være allergisk overfor Dapson.

Det er vigtigt, at du kontakter din hudlæge, hvis du får bivirkninger.

#### **Prævention, graviditet og amning**

Dapson bør ikke tages i forbindelse med graviditet og amning.

© Copyright Dansk dermatologisk Selskab · 1. udgave 

TRYKKESTEDET ÅRHUS APS - 86 13 62 88