

Neomycin

Lappeprøven viser kontaktallergi over for **Neomycin**. Det vil sige, at man vil få eksem, hvis der kommer medicin, som indeholder neomycin, på huden, i ørerne eller i øjnene.

Allergien er varig, men den kan svækkes med tiden, såfremt man undgår kontakt med neomycin.

Hvad er Neomycin ?

Neomycin er et stof, som virker hæmmende på bakterier. Det findes derfor i nogle lægemidler, der virker mod betændelse.

Framycetin, som er et beslægtet stof, vil ofte have samme virkning som neomycin. Det betyder, at man, hvis man har neomycinallergi, som regel heller ikke tåler framycetin.

Nogle personer, som har neomycinallergi kan få udslæt på huden, hvis de behandles med den gruppe antibiotika, som hedder **aminoglycosider**. Aminoglycosider bruges som injektionsbehandling af alvorlige infektioner.

Husk at oplyse lægen om din allergi over for neomycin

Hvor findes neomycin/framycetin ?

Det vil fremgå af lægemidlets deklARATION, om det indeholder neomycin eller framycetin.

Neomycin forekommer f.eks. i:

- Kenalog Comp. med Mycostatin creme
- Decadron med Neomycin øjendråber

Framycetin forekommer f.eks. i:

- Proctocedyl suppositorier og rektalsalve
- Sofradex øjen- og øredråber

Læs mere om allergi på
www.videncenterforallergi.dk

Videncenter for Allergi, Gentofte Hospital
og Den Danske Kontaktdermatitis Gruppe

December 2006