

I pjecen informeres om behandling med tetracyclin.

Hvis der er spørgsmål, som ikke er besvaret, bør de stilles til hudlægen.

### **Hvordan virker tetracyclin?**

Tetracycliner (tetracyclin, oxytetracyclin og doxycyclin) er antibiotika, som hæmmer bakterievækst. De dæmper også betændelseslignende tilstande, som ikke er fremkaldt af bakterier. Tetracyclin anvendes bl.a. til behandling af acne og lignende hudlidelser.

Tetracyclin bindes til kalk (fx. i mælkeprodukter), jern, zink, magnesium og aluminium (fx. i syre-neutraliserende medicin). Samtidig indtagelse af tetracyclin og disse stoffer medfører, at tetracyclin ikke opsuges i tarmen, og virkningen nedsættes/udebliver.

### **Hvordan tages tetracyclin?**

I tablettform 1-2 gange daglig med vand og sammen med et let måltid uden mælk og lignende. Mælkeprodukter kan indtages 1-3 timer før eller efter tetracyclintabletterne, uden at tetracyclinbehandlingen påvirkes.

### **Tetracyclin og anden medicin**

Under antibiotikabehandling for infektion med penicillin og lignende præparater bør tetracyclinbehandlingen stoppes, og den kan senere genoptages.

Roaccutan® og Neotigason® må ikke tages under tetracyclinbehandling.

Blodfortyndende medicin (Coumarin® og lignende) må kun efter aftale med lægen tages sammen med tetracyclin.

### **Bivirkninger**

Tetracyclin ændrer også tarmens naturlige bakterieflora. Denne ændring kan give forbigående luft i maven eller let forstoppelse/diaré.

Kommer der betydelig og længerevarende diaré, bør tetracyclinbehandlingen stoppes og hudlægen kontaktes.

Hos kvinder kan tetracyclin ligesom andre antibiotika medføre ændring i skedens bakterieflora med overvækst af gærsvampe. I enkelte tilfælde viser det sig som svie og udflåd, der kræver svampebehandling. Tal med hudlægen herom.

I sjældne tilfælde ses øget lysfølsomhed med udslæt.

### **Prævention, graviditet og amning**

Kvinder, der tager p-piller, kan risikere, at p-pillerne ikke er sikre den første måned under tetracyclinbehandling. I denne periode bør p-piller suppleres med anden form for svangerskabsbeskyttelse, samtidig med at p-pillebehandlingen fortsættes.

Tetracyclin må ikke tages under graviditet og amning.

Under langvarig tetracyclinbehandling tilrådes vitamintilskud med almindelige multivitamin-tabletter.

Hudlægen informerer om

# Tetracyclin



COPYRIGHT III

Dansk dermatologisk Selskab