

Primær aksillær hyperhidrose

Topikal antiperspirantia ex. glycopyrroniumbromid 2-7 x ugentlig, aluminiumchlorid hexahydrat x 3 ugentligt. Sikre korrekt anvendelse. Evt. kombinér med topikalt kortikosteroid.

God effekt

Ja

Fortsæt

Overvej supplerende systemisk behandling med glycopyrrolat (1. valg), oxybutynin eller methanthelinbromid.

Nej

Intradermal injektion med botulinum toxin A til svær aksillær hyperhidrose. Som udgangspunkt tilbydes behandlingen efter gravimetrisk måling, der hos mænd viser > 0.1 g sved/ 5 min/pr aksil. og hos kvinder viser > 0.05 g sved/ 5 min/pr aksil. Behandlingen gentages med minimum 6-9 mdr.'s interval. Behandlingsindikationen revurderes efter 3-4 behandlinger.

Fortsæt ved behov med minimum 6-8 mdr.'s interval

Ja

God effekt defineret som minimum 6 mdr.'s effekt

Nej

Mikrobølgedemedieret termolyse x 1-2. Kan tilbydes til patienter med svær hyperhidrose og utilstrækkelig effekt af botulinum toxin A. Patienterne skal opfylde kriterierne for botulinum toxin A behandling. Evt, kombiner med botulinum toxin A behandling.

Nej

God effekt

Ja

Fortsat botulinum toxin A behandling eller evt. henvisning til plastikkirurgisk afdeling mhp. lokal fjernelse af svedkirtlerne: liposuction curretage. Udføres af visse plastikkirurger.

Ikke yderligere